

## आले

- जमीन** : मध्यम ते हलकी पाण्याचा चांगला निचरा होणारी असावी.
- पूर्वमशागत** : उभ्या -आडव्या दोन खोल नांगरटी, ढेकळे फोडणे, कुळवणे इ.
- सुधारित वाण** : माहिम, रिओ-डी-जानेरो, कालीकत, महिमा, वरदा
- पेरणी** : एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून मे महिन्याअखेर.
- बियाणे** : २५ ते ४५ ग्रॅम वजनाचे डोळे फुगलेले, १८ ते २० किंटल बियाणे प्रति हेक्टर.
- बीजप्रक्रिया** : किनॉलफॉस २५ ईसी (२० मि.ली.) १० लि. पाण्याच्या द्रावणात बियाणे २० मिनिटे बुडवून लागवडीस वापरावे.
- खते** : शेणखत ५० ते ८० बैलगाड्या पूर्वमशागतीचे वेळी मातीत मिसळून द्यावे. नत्र १२० किलो प्रति हेक्टरी तीन समान हप्त्यात लागवणीनंतर पहिला हप्ता दीड महिन्यांनी त्यानंतर दुसरा व तिसरा हप्ता एक एक महिन्याचे अंतराने द्यावा. स्फुरद ७५ किलो व पालाश ७५ किलो प्रति हेक्टर लागवडीपूर्वी वाफ्यात पसरून द्यावे.
- भरखते** : हेक्टरी २ टन निंबोळी किंवा करंजी पेंड आल्याची उटाळणी करतेवेळी लागवडीनंतर २.५ ते ३ महिन्यांनी वापरावी.
- आंतरमशागत** : आवश्यकतेनुसार ३ ते ४ खुरपण्या कराव्यात. जमीन जास्त तुडवली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
- पाणी व्यवस्थापन** : जमिनीचे मगदुरानुसार ८ ते १० दिवसांच्या अंतराने पाण्याच्या पाळ्या द्याव्यात. ठिबक किंवा तुषार सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा वापर केल्यास उत्पादन वाढते.
- काढणी** : लावणीनंतर ८ ते १० महिन्यांनी पाने पिवळी पडल्यावर किंवा वाळल्यावर कुदळीच्या सहाय्याने खांदणी करून काढणी करावी.
- उत्पादन** : १५ ते २० टन / हेक्टर.